


Atenção com Relação à Vacina contra o Novo Coronavírus Produzida pela Pfizer

- ① É necessário que a vacina produzida pela Pfizer seja realizada **no total de 2 aplicações**.
- ② Após a 1ª aplicação da vacina, abrir **um intervalo de 3 semanas**, e em seguida realizar a 2ª aplicação.
- ③ Se a 1ª aplicação for realizada com a vacina produzida pela Pfizer, **a 2ª aplicação também deverá ser da Pfizer**.

A vacinação contra o Novo Coronavírus, será realizada no músculo da parte superior do braço.

No dia da aplicação da vacina, dirigir-se ao local, utilizando-se **uma roupa fácil de expor o ombro (camiseta de manga curta, camisa com botão, etc.)**



~Perguntas e Respostas com Relação à Vacina~

P1 Ultrapassaram-se mais que 3 semanas entre a 1ª e 2ª vacina, o que devo fazer?

R. Na medida do possível, solicita-se que a 2ª aplicação seja realizada o mais rápido possível.

P2 No passado, tive alergia ao realizar outras vacinas, ao ingerir certos alimentos, ao utilizar cosméticos, por isso há algum problema se aplicar a vacina?

R. Solicita-se que preencha as informações sobre a alergia no questionário médico preliminar, e consultar o médico de costume antecipadamente, ou contatar o médico no dia da aplicação.

P3 Qual é a porcentagem de eficácia da vacina?

R. A vacina produzida pela Pfizer "COMIRNATY", deverá ser aplicada no total de 2 doses, abrindo-se um intervalo de 3 semanas entre a 1ª e a 2ª dose. Depois que passar 7 dias após a aplicação da 2ª dose, há uma eficácia de 95% (eficácia na prevenção da manifestação de sintomas). As examinações clínicas estão prosseguindo, por isso haverá mais informações futuras.

Cuidados após a Vacinação

•Após tomar a vacina, será necessário esperar no mínimo 15 minutos no local (e no mínimo 30 minutos, para as pessoas que tiveram sintomas alérgicos graves no passado, incluindo-se anafilaxia, ou ter perdido a consciência, etc.), e no caso de se sentir mal, consulte o médico imediatamente. (Pois, haverá a possibilidade de tomar as devidas providências na ocorrência de efeitos colaterais repentinos)

•Manter o local injetado limpo. E no dia da vacinação, será possível tomar banho, evitando-se esfregar o local.

•Evitar realizar exercícios físicos extremos no dia da vacinação.

Sobre os Efeitos Colaterais

Fique atento nas condições físicas após a vacinação (especialmente por vários dias)

(Efeitos colaterais que ocorreram em 10% das pessoas que receberam a vacina)

- Dor ou inchaço no local vacinado Diarreia Dor de cabeça
- Dores musculares ou nas articulações Fadiga, Calafrio, Febre

•Algumas dores no local vacinado, manifestaram-se no dia de vacinação e no máximo por dois dias posteriores. E os outros sintomas, na maioria dos casos ocorreram no dia seguinte da vacinação, e no máximo por um dia.

•A maioria dos sintomas, ocorreram com frequência, após a 2ª aplicação do que após a 1ª aplicação. E na maioria dos casos, ocorreram em pessoas que não eram idosas.

•Tais sintomas, normalmente cessam em alguns dias, contudo se os sintomas graves se manifestarem, tais como dores severas (inchaço, febre alta, etc.), realize uma consulta médica.

(Sérios efeitos colaterais que ocorrem raramente)

Normalmente ocorrem dentro de 30 minutos após a aplicação.

- Choque Anafilaxia

Efeitos relacionados à pele (coceira, urticária, eritema, vermelhidão, etc.), sintomas do órgão gastrointestinal (dor abdominal, náusea, etc.), anormalidade visual, órgãos respiratórios (rouquidão, espirros, coceira na garganta, dificuldade respiratória, etc.), sintomas de choque (palidez, consciência alterada, etc.)

Sobre o Sistema de Auxílio por Danos à Saúde devido à Vacinação

A vacina pode causar problemas de saúde (doença ou deficiência). Embora seja extremamente raro, o risco não pode ser eliminado e por esse motivo, foi estabelecido um sistema de auxílio. No caso de danos à saúde decorrente da vacina contra o Novo Coronavírus, o auxílio (despesas médicas e benefícios de pensão por invalidez, etc.) também está disponível sob a Lei de Imunização. Em relação aos procedimentos necessários para o requerimento, consulte o município onde está registrado.

As informações sobre a vacina estão divulgadas no **Site às Pessoas e seus Familiares os quais Aplicarão a Vacina contra o Novo Coronavírus da Pfizer**

Acesse através do QR à direita ou através do URL abaixo.

<https://pfizer-covid19-vaccinated.jp>

